

ATORLIP COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 y 20 mg



PHARMAVITA®

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICION Y PRESENTACION

Cada comprimido recubierto contiene:

Atorvastatina 10 mg ó 20 mg
Excipientes c.s.

Excipientes: carbonato de calcio, lactosa monohidrato, almidón de maíz, croscarmelosa sódica, polividona K30, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, crospovidona, hipromelosa, macrogol 400, dióxido de titanio.

Vía de Administración: Oral

Presentación = Envase con 30 comprimidos recubiertos.

CLASIFICACION: Hipocolesterolemiante.

INDICACIONES: Este medicamento ayuda a prevenir trastornos de salud causados por obstrucción de los vasos sanguíneos por colesterol.
Este medicamento debe ser usado sólo por indicación de su médico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

a) Alergias: Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

b) Embarazo: No debe tomar este medicamento sin antes comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. Este medicamento no se debe usar durante el embarazo o por mujeres que estén en condiciones de embarazarse. En el último caso debe usarse un método de control de la natalidad adecuado, durante el tratamiento con este medicamento. Si usted cree estar embarazada, consulte inmediatamente con su médico Este medicamento puede causar defectos en el feto u otras problemas si se toma durante el embarazo.

c) Lactancia: Ud. debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras esté amamantando. No se recomienda su uso durante la lactancia ya que puede causar efectos indeseables en el lactante.

d) Niños: Este medicamento no está indicado para su uso en niños.

e) Antes de prescribir este medicamento, su médico indicará probablemente a ud. una dieta adecuada a su caso específico. Muchas personas pueden controlar adecuadamente su colesterol sanguíneo con sólo seguir la dieta adecuada y ejercicio físico indicado por el médico. El medicamento se prescribe sólo si se necesita una medida adicional y es efectivo sólo si se sigue adecuadamente un régimen dietético y de ejercicio físico apropiados.

f) Este medicamento puede ser menos eficaz si usted presenta un sobrepeso exagerado, por lo que puede ser importante el previo seguimiento de una dieta, adecuadamente supervisada por su médico.

g) Es importante que el médico evalúe el progreso de su tratamiento a intervalos regulares para comprobar si el medicamento disminuye sus niveles de colesterol y que no causan efectos indeseables.

h) No suspenda por su cuenta la administración de este medicamento sin consultarlo previamente con su médico. Al dejar de tomar este medicamento sus niveles de colesterol pueden aumentar nuevamente. Su médico puede considerar conveniente indicar a Ud. una dieta apropiada para prevenir que esto ocurra.

i) Antes de ser sometido a cualquier clase de cirugía (incluyendo cirugía dental) o algún tratamiento de emergencia, comunique al médico o dentista correspondiente, que Ud. está tomando este medicamento.

INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que esta tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.

Es particularmente importante que su médico sepa si usted está tomando ciclosporina, anticoagulantes (medicamentos que previenen los coágulos sanguíneos), tales como warfarina o acenocumarol, medicamentos antimicóticos (que sirven para combatir enfermedades por hongos, tales como

ketoconazol, itraconazol, etc.), otros medicamentos para reducir el colesterol tales como bezafibrato, fenofibrato y gemfibrozil, los antibióticos eritromicina y claritromicina, inhibidores de la proteasa del HIV (un tipo de medicamentos empleados para combatir el sida, tales como indinavir, nelfinavir, ritonavir y saquinavir), el antidiabético nefazodona o dosis altas (más de 1 gramo diario) de nicotinamida o ácido nicotínico (niacina).

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Ud. debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes:

- Alcoholismo o antecedentes de abuso de bebidas alcohólicas.
- Enfermedades de hígado (el uso de este medicamento podría agravarlas).
- Niveles de enzimas hepáticas permanentemente elevadas.
- Infecciones severas.
- Presión arterial baja.
- Convulsiones.
- Transplante de órganos con terapia para prevenir rechazo.
- Cirugía mayor reciente (Estos pacientes pueden tener riesgo de desarrollar alteraciones que lleven a insuficiencia renal).

EFFECTOS ADVERSOS: (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Consulte inmediatamente al médico si presenta algunos de los síntomas siguientes: Raramente, puede presentarse fiebre, dolor o calambres musculares, dolor estomacal severo, cansancio o debilidad inusual.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que se desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). **No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlos a su médico.**

Con mayor frecuencia puede presentarse trastornos digestivos tales como constipación, diarrea, flatulencia, náuseas, dolor estomacal y ardor en la boca del estómago. También puede presentarse mareos, erupción de la piel y dolor de cabeza.

Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.

FORMA DE ADMINISTRACION:

Usese este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia que la que su médico le indique.

DOSES: El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Dosis usual en adultos

Hipercolesterolemia heterocigota familiar y no familiar y dislipidemia mixta (Fredrickson tipos IIa y IIb): Dosis inicial de ATORLIP de 10 mg una sola vez al día. El rango de dosis es de 10 a 80 mg una vez al día. Después de iniciada la terapia, las concentraciones de lípidos deben ser medidas dentro de 2 ó 4 semanas y la dosis ajustada según corresponda.

Nota: El objetivo de la terapia es disminuir la LDL-C. The National Cholesterol Education Program (NCEP) recomienda que las concentraciones de LDL-C sean usadas para iniciar y asegurar la respuesta al tratamiento. Solamente si las concentraciones de LDL-C no están disponibles, se debe usar el total-C como monitor de la terapia.

Hipercolesterolemia familiar homocigota: Dosis de 10 a 80 mg por día.

Nota: ATORLIP debe ser administrado en estos pacientes como un adyuvante a otros tratamientos reductores de lípidos, tales como, atresis de LDL, o si tal tratamiento no están disponibles.

Límite de dosis usual adultos a prescribir: 80 mg por día.

Dosis usual pediátrica

Hipercolesterolemia familiar homocigota: La dosis no ha sido establecida.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

PHARMAVITA S.A.

Nueva Los Leones 07, Oficina 707, Providencia, Santiago - Chile.

