



PRESOVASC® COMPRIMIDOS PHARMAVITA®

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

Lea todo el folleto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. Conserve este folleto, puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se prescribe para usted. No debe ser utilizado por otra persona. Puede perjudicarlo, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

PRESENTACION

PRESOVASC está disponible en envases con 30 ó 60 comprimidos para administración oral en dosis de 5 mg ó 10 mg.

COMPOSICION

Comprimidos conteniendo amlodipino besilato equivalente a 5 mg ó 10 mg de amlodipino. Los comprimidos incluyen los siguientes ingredientes inertes: celulosa microcristalina, crospovidona, almidón sodio glicolato, magnesio estearato, talco dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica.

CATEGORIA FARMACOLOGICA

Antihipertensivo, Antianginoso.

VENTA BAJO RECETA MEDICA INDICACIONES

PRESOVASC está indicado en el tratamiento de la angina de pecho crónica estable; angina vasoespástica, angina variante de Prinzmetal confirmada o sospechada; e hipertensión arterial.

PRESOVASC debe utilizarse sólo por indicación de su médico.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a las dihidropiridinas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. PRESOVASC debe administrarse con precaución en caso de estenosis aórtica severa, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. La seguridad durante el embarazo y la lactancia no se ha establecido.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS

El administrar PRESOVASC junto con otros medicamentos puede resultar en una modificación del efecto terapéutico deseado de uno de los medicamentos. Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica antes de iniciar el tratamiento con PRESOVASC. No se sabe de ninguna interacción significativa con otro medicamento. No tome bebidas alcohólicas a menos que su profesional médico le dé permiso. Nunca la tome con comidas ricas en grasas o con jugo de toronja, porque ellos pueden llegar a multiplicar el efecto del medicamento. Tome este medicamento con agua sola.

REACCIONES ADVERSAS

PRESOVASC es bien tolerado. La mayoría de los efectos adversos reportados durante el tratamiento con el fármaco han sido entre leves y moderados y generalmente se atenúan o desaparecen luego de las primeras semanas de

tratamiento. Los efectos adversos más frecuentemente observados son cefalea, edemas (hinchazón de las manos o pies) en extremidades, fatiga, náuseas, rubor facial y vértigo (mareos) dolores abdominales y somnolencia.

Si usted nota algún otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis consulte a su médico.

DOSIFICACION

La que su médico indique.

PRESOVASC debe ser administrado por vía oral una vez al día, con o sin alimento. El comprimido de PRESOVASC debe tragarse sin masticar, con ayuda de un poco de líquido. Tome este medicamento regularmente y por el periodo de tiempo indicado, aun si ya se siente mejor. para no olvidarse, tómelo siempre a la misma hora del día.

Tome este medicamento exactamente como se lo recetó su profesional médico. Nunca tome una dosis mayor que la recetada, ni con mayor frecuencia.

En general este medicamento se toma una vez al día. No tome más de 10 mg por día al menos que su profesional médico se lo haya indicado. Puede causar efectos secundarios en dosis más altas.

Siga las indicaciones de su profesional médico para tomar otros medicamentos con este medicamento. La mayoría de medicamentos para la presión alta o dolor de pecho (angina) se puede usar con éste medicamento sin peligro. Si tiene alguna pregunta, consulte con su profesional médico o farmacéutico.

No deje de tomar este medicamento sin autorización previa de su profesional médico. Es posible que deba seguir tomándolo para siempre.

Si se olvida de tomar una dosis, hágalo apenas se dé cuenta, a menos que sea casi la hora de tomar otra dosis. En ese caso, tome el medicamento a la hora correspondiente a la dosis siguiente. No tome nunca dosis doble.

INFORMACION GENERAL DE DOSIFICACION

Interrupción del tratamiento: Tras la interrupción del tratamiento pueden ocurrir reacciones por retirada. Debería evitarse la interrupción brusca del tratamiento con PRESOVASC.

Dieta/Nutrición: PRESOVASC puede ser administrado con o sin alimento.

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo 40°C, preferentemente entre 15 y 30°C. Proteger de la luz directa. No se deje al alcance de los niños.

PHARMAVITA S.A.

Nueva Los Leones 07, Oficina 707, Providencia, Santiago - Chile.

